

Karaniwang mga pangyayari at panganib sa anestesiya

Ipinapakita nitong card na pambuod ang mga karaniwang pangyayari at panganib na maaaring kaharapin ng mga malulusog at nasa-gulang na pasyente na may normal na timbang kapag nagkakaroon ng pangkabuuang anestesiya para sa karaniwang operasyon (iba-ibang panganib ang dinadala ng mga espesyalistang operasyon).

Ligtas ang makabagong anestesiya. May mga pangkaraniwang epekto ang mga gamot na anestesiya o ang mga kagamitan, na kadalasan ay hindi seryoso o tumatagal. Iba-iba ang panganib sa bawat tao at depende ito sa pamamaraan ng ginamit na anestesiya. Tatalakayin ng iyong anestesista ang mga panganib na makakaapekto sa iyo.

May mga hindi karaniwang panganib na kadalasan ay hindi na tatalakayin ng iyong anestesista maliban na lang kung sa tingin nila ay malaki ang panganib para sa iyo. Hindi na ipinakita ang mga ito sa card na ito.



Karaniwan – higit sa 1 sa bawat 10
Katumbas ng isang tao sa iyong pamilya



Pagkakasakit



Panginginig



Pagkauhaw*



Pananakit ng
lalamunan



Madaling
magkapasa



Pansamantalang
pagkawala ng alaala (para
sa mga 60 gulang pataas)



Karaniwan – pagitan ng 1 sa bawat 10 at 1 sa bawat 100
Katumbas ng isang tao sa daan



Pananakit sa iniksyunang lugar*



Maliit na pinsala sa labi o dila



Hindi karaniwan – sa pagitan ng 1 sa bawat 100 at 1 sa bawat 1,000
Katumbas ng isang tao sa isang pook



Maliit na pinsala sa mga pandama



Pambihira – pagitan ng 1 sa bawat 1,000 at 1 sa bawat 10,000
Katumbas ng isang tao sa isang maliit na pook



1 sa bawat 1,000

Permanenteng
pinsala sa peripheral
na pandama



1 sa bawat 2,800

Corneal abrasion
(sugat sa mata)



1 sa bawat

4,500

Pinsala sa ngipin na
kailangang gamutin



1 sa bawat

10,000

Anaphylaxis
(malubhang allergic
reaction sa droga)



Higit na pambihira – 1 sa bawat 10,000 hanggang 1 sa bawat 100,000 o higit pa
Katumbas ng isang tao sa isang malaking pook



Ang mga pang-araw-araw na panganib, **katulad ng pagbabahe sa kalsada**, ay mas mataas kaysa mga panganib sa baba.



1 sa bawat 20,000

Pagkagising habang nagmamahid



1 sa bawat

100,000

Pagkabulag



1 sa bawat

100,000

Kamatayan bilang
direktang resulta ng
pagpapamanhid

*Ang unang Sprint National Anaesthesia Project (SNAP-1) Study. Br J Anaesth 2016 (<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).