

اینسٹھیزیا میں عام واقعات اور خطرات

یہ خلاصہ کارڈ ان عام واقعات اور خطرات دکھاتا ہے جو عام وزن کے صحت مند بالغ مریضوں کو معمول کی جراحی کے لیے عام اینسٹھیزیا لینے پر پیش آ سکتے ہیں (مابراہ جراحیوں میں مختلف خطرات ہو سکتے ہیں)۔

جدید اینسٹھیزیا بہت محفوظ ہیں۔ اینسٹھیزیاک ادویات یا استعمال ہونے والے آلات کے کچھ عام ضمنی اثرات ہوتے ہیں جو عام طور پر سنگین یا دیرپا نہیں ہوتے ہیں۔ خطرات افراد کے درمیان مختلف ہوں گے اور وہ طریقہ کار اور استعمال کی گئی اینسٹھیزیاک کی تکنیک پر منحصر ہوں گے۔ آپ کا اینسٹھیزیا آپ کے ساتھ ان خطرات پر تبادلہ خیال کرے گا جنہیں وہ آپ کے لئے بہت اہم سمجھتا ہے۔

اس کے علاوہ بھی دیگر غیر عام خطرات ہیں جس پر آپ کا اینسٹھیزیا اس وقت تک بات نہیں کرے گا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ آپ ان خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کارڈ میں نہیں دکھائے گئے ہیں۔



کانپنا



بیماری

بہت زیادہ عام - 10 میں سے ایک سے زیادہ جو آپ کی فیملی میں ایک شخص کے برابر ہے



عارضی طور پر یادداشت کا کھونا (بنیادی طور پر 60 سال سے زیادہ کی عمر میں)



خراش

گلے کی سوزش



پیاس*



عام - 1 سے 10 کے درمیان اور 1 سے 100 کے درمیان جو گلی میں ایک شخص کے برابر ہو



بونٹ یا زبان پر معمولی چوٹ



انجیکشن کی جگہ پر درد*



غیر معمولی - 1 اور 100 کے درمیان اور 1 سے 1000 کے درمیان گاؤں کے ایک شخص کے برابر ہے



معمولی اعصابی چوٹ



شاذ و نادر - 1 اور 1000 کے درمیان اور 1 سے 10000 کے درمیان چھوٹے شہر میں موجود ایک شخص کے برابر



10000 میں 1

Anaphylaxis (کسی منشیات پر اثر دکھانے کے لیے شدید الرجی)



1 میں 4500 اس دانت کو نقصان جس کے علاج کی ضرورت ہے



1 میں 2800 کورنیل ابراؤن (آنکھ پر کھرونج)



1 میں 1000 پریفیرل اعصابی نقصان جو دائمی ہے



بہت ہی نادر - 1 میں 10000 جو 1 میں 100000 یا زیادہ لوگ ایک بڑے شہر میں موجود ایک شخص کے برابر



جو خطرات ہم عام زندگی میں اٹھاتے ہیں، جیسے سڑک کے ذریعے سفر کرنا، درحقیقت مندرجہ ذیل خطرات سے بہت بڑے ہیں۔

1 میں 100000 اینسٹھیزیا کے براہ راست نتیجہ کے طور پر موت



1 میں 100000 بصارت کا نقصان



1 میں 20000 اینسٹھیزیا کے دوران بیداری



* پہلا اسپرنٹ نیشنل اینسٹھیزیا پروجیکٹ (SNAP-1) مطالعہ۔ Br J Anaesth 2016. <https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>