

خطرات و پیامدهای معمول در بیهوشی

این برگه خلاصه ای از خطرات و پیامدهای معمول در بیهوشی بیماران سالم بالغ دارای وزن نرمال به هنگام بیهوشی عمومی برای عمل جراحی معمول نشان می دهد. (در جراحی های تخصصی ممکن است خطرات دیگری را به دنبال داشته باشد).

داروهای بیهوشی جدید ایمنی بسیار بالایی دارند. البته، داروهای بیهوشی یا تجهیزات به کار رفته عوارض جانبی شایعی نیز دارند که اغلب جدی یا بلندمدت نیستند. خطر بیهوشی برای اشخاص مختلف متفاوت است و به فرآیند جراحی و تکنیک بیهوشی استفاده شده بستگی دارد. متخصص بیهوشی درباره ی خطراتی که به نظرش مهمتر هستند با شما صحبت می کند.

بیهوشی ممکن است خطرات دیگری نیز داشته باشد که چندان شایع نیستند. طبق روال معمول، متخصص بیهوشی فقط در صورتی درباره این خطرات با شما صحبت می کند که احتمال مواجهه شما با آنها را بالا بداند. در این برگه اشاره ای به این خطرات نشده است.



لرز



تهوع

بسیار شایع – بیشتر از یک نفر از هر ۱۰ نفر
معادل یک نفر در خانواده شما



از دست دادن موقت حافظه
(بیشتر در بیماران بالای ۹۶ سال)



کبودی



گلورد



تشنگی*



شایع – بین یک نفر از هر ۱۰ نفر و ۱ نفر از هر ۱۰۰ نفر
معادل یک نفر در یک خیابان



جراحت جزئی لب یا زبان



درد در محل تزریق*



غیرشایع – بین ۱ نفر از هر ۱۰۰ نفر و ۱ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر
معادل یک نفر در یک روستا



آسیب جزئی عصب



نادر – بین ۱ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر و ۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰ نفر
معادل یک نفر در یک شهر کوچک



۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰ نفر
آنافیلاکسی (واکنش حساسیتی شدید به دارو)



۱ نفر از هر ۴۵۰۰ نفر
آسیب دندانها به طوری که نیاز به درمان دارند



۱ نفر از هر ۲۸۰۰ نفر
خراش قرنیه (خراشیدگی روی چشم)



۱ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر
آسیب دائمی عصب محیطی



بسیار نادر – ۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰ نفر تا ۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر یا بیشتر
معادل یک نفر در یک شهر بزرگ



خطراتی که همه ما در زندگی عادی مان قبول می کنیم، از جمله سفر جاده ای، در واقع بسیار بزرگتر از خطراتی هستند که در ادامه می آیند.

۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر
مرگ مستقیم بر اثر بیهوشی



۱ نفر از هر ۱۰۰۰۰۰ نفر
از دست دادن بینایی



۱ نفر از هر ۲۰۰۰۰ نفر
هشجاری طی بیهوشی



*اولین طرح مطالعاتی فوری ملی درباره بیهوشی (SNAP-1). Br J Anaesth 2016
(<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).