

Dažniau pasitaikantys reiškiniai ir rizika, susiję su anestezija

Šiame bendro pobūdžio informacijos lape apibūdinti dažniau pasitaikantys reiškiniai ir rizika, kuriuos patiria sveiki, normalaus svorio suaugusieji pacientai, kai jiems taikoma bendroji anestezija eilinės operacijos metu (specifinės operacijos gali kelti kitokio pobūdžio riziką).

Modernūs anestetikai yra labai saugūs. Esama dažnesnių šalutinio poveikio reiškinų, kuriuos sukelia anestetikai arba naudojama įranga, tačiau tas poveikis paprastai nėra didelis ir ilgai netrunka. Rizikos laipsnis įvairiems žmonėms nėra vienodas ir priklauso nuo atliekamos procedūros ir anestezijos metodo. Jūsų anesteziologas su Jumis aptars rizikos veiksnius, kurie, jo manymu, Jums gali būti svarbūs.

Esama ir kitų, ne tokių dažnų rizikos veiksnių, kurių anesteziologas paprastai neaptaria, nebent, jo manymu, Jūs patenkate į didesnės rizikos grupę. Šiame informaciniame lape jie nenurodyti.



LABAI DAŽNAS - DAUGIAU NEI 1 IŠ 10.

Atitinkamai vienam asmeniui jūsų šeimoje



Ligos



Drebulys



Troškulys*



Gerklės skausmas



Kraujosrūvos



Laikinas atminties praradimas
(dažniausiai pasireiškiantis asmenims, kuriems virš 60 metų)



DAŽNAS - TARP 1 IŠ 10 IR 1 IŠ 100.

Atitinkamai vienam asmeniui gatvėje



Skausmas injekcijos vietoje*



Nedideli lūpos ar liežuvio sužeidimai



NEDAŽNI - PASIREIŠKANTYS 1 IŠ 100 IR 1 IŠ 1000 ASMENŲ.

Atitinkamai vienam asmeniui visame kaime



Nedidelis nervinės
sistemos sužeidimas



RETAS - PASIREIŠKANTIS 1 IŠ 1000 IR 1 IŠ 10 000 ASMENŲ.

Atitinkamai vienam asmeniui nedideliame miestelyje



1 iš 1000
žmonių patirs nuolatinį
periferinių nervų
pažeidimą



1 iš 2 800
patirs ragenos
abraziją (įbrėžimas
ant akies)



1 iš 4 500
žmonių patirs žalą
dantims, kuriuos
vėliau reikės taisyti



1 iš 10 000
žmonių patirs anafiksiją - smarkią aler-
ginę reakciją į vaistus



LABAI RETAS - NUO 1 IŠ 10 000 ASMENŲ IKI 1 IŠ 100 000 ASMENŲ AR DAUGIAU.

Atitinkamai vienam asmeniui dideliame mieste



1 iš 20 000

sąmoningumas anestezijos metu



1 iš 100 000

regėjimo praradimas



1 iš 100 000

anestezijos sukelta
mirtis

*Pirmasis „Sprint“ nacionalinės anestezijos projekto (SNAP-1) tyrimas. Br J Anaesth 2016 m.
(<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).