

الحوادث والمخاطر الشائعة للتخدير

تُوضح بطاقة التلخيص هاته الحوادث والمخاطر الشائعة التي يواجهها المرضى البالغون الأصحاء أصحاب الوزن الطبيعي عند التعرض لتخدير عام لإجراء جراحة روتينية (قد تنطوي العمليات الجراحية المتخصصة على مخاطر مختلفة).

المواد المخدرة الحديثة آمنة للغاية. هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة لأدوية/لمواد التخدير أو المعدات المستخدمة والتي لا تكون عادة خطيرة أو مستمرة لفترة طويلة. تختلف المخاطر من فرد لآخر وتعتمد على العملية وتقنية التخدير المستخدمة. سيناقش طبيب التخدير الخاص بك معك المخاطر التي يعتقد أنها قد تكون أكثر أهمية بالنسبة لك. وأيضاً ينبغي عليك مناقشتهم في أي أمر تجده هاماً بالنسبة لك.

هناك مخاطر أقل شيوعاً لن يناقشها طبيب التخدير معك عادة إلا إذا اعتقد أنك عرضة لخطر أكبر. لم تُوضَّح هذه الأخيرة في هذه البطاقة.



قشعريرة



غثيان

شائع جداً – أكثر من 1 من كل 10 يساوي واحد في عائلتك



فقدان مؤقت للذاكرة (بشكل رئيسي خلال ما يزيد على 60 ثانية)



كدمات



التهاب الحلق



العطش*



شائع – بين 1 من كل 10 و 1 من كل 100 يعادل شخصاً واحداً في شارع



الإصابات الطفيفة في الشفة أو اللسان



الأم في موضع الحقن*



غير شائع – بين 1 في 100 و 1 في 1000 بما يعادل شخصاً في قرية



إصابات طفيفة في الأعصاب



نادرة – بين 1 من كل 1000 و 1 من كل 10000 بما يعادل شخصاً في مدينة صغيرة



1 من كل 10000 الحساسية المفرطة (رد فعل شديد للحساسية نتيجة للدواء)



1 من كل 4500 تلف في الأسنان يستدعي العلاج



1 من كل 2800 تآكل قرنية (خدش في العين)



1 من كل 1000 تلف دائم في أعصاب أحد الأطراف



نادر للغاية – 1 من كل 10000 حتى 1 من كل 100000 أو أكثر بما يعادل واحداً في مدينة كبيرة



إن المخاطر التي نتعرض لها في حياتنا الطبيعية مثل السفر في رحلات هي فعلياً أكبر من الأخطار الموضحة أدناه.

1 من كل 100000 حالة وفاة كنتيجة مباشرة للتخدير



1 من كل 100000 حالة فقدان للبصر



1 من كل 20000 حالة تحتفظ بالوعي أثناء التخدير



*دراسة مشروع التخدير الوطني الأول. 1. Br J Anaesth 2016.

(<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).