

## Често срещани явления и рискове при анестезия

В настоящата карта са описани често срещаните явления и рискове, пред които се изправят здрави възрастни пациенти с нормално тегло, когато им е приложена обща анестезия при рутинна операция (специализираните операции могат да крият други рискове).

Съвременните анестетици са много безопасни. Съществуват някои често срещани странични ефекти от упойващите вещества или използваното оборудване, които обикновено не са сериозни или дълготрайни. Рискът ще е различен при различните хора и ще зависи от процедурата и използвания метод на анестезия. Вашият анестезиолог ще обсъди с Вас рисковете, които смята за по-значими за Вас. Вие също трябва да обсъдите с него/нея всичко, което смятате, че е важно за Вас.

Има и други по-рядко срещани рискове, които Вашият анестезиолог обикновено няма да спомене, освен ако не смята, че сте изложени в по-висока степен на тях. Те не са описани в тази карта.



**МНОГО ЧЕСТО СРЕЩАНИ – ПОВЕЧЕ ОТ 1 НА 10**  
Равносилно на един човек в семейството Ви



Гадене



Втрисане



Жажда\*



Болки в гърлото



Синини



Временна загуба на паметта  
(предимно сред над 60-годишните)



**ЧЕСТО СРЕЩАНИ – МЕЖДУ 1 НА 10 И 1 НА 100**  
Равносилно на един човек на всяка улица



Болка на мястото на инжектиране\*



Леко нараняване на устните или езика



**НЕ ЧЕСТО СРЕЩАНИ – МЕЖДУ 1 НА 100 И 1 НА 1 000**  
Равносилно на един човек в село



Леко увреждане на нервите



**РЕДКИ – МЕЖДУ 1 НА 1 000 И 1 НА 10 000**  
Равносилно на един човек в малък град



**1 на 1 000**  
Увреждане на периферните нерви, което е постоянно



**1 на 2 800**  
Ожулвания на роговицата (надраскване на окото)



**1 на 4 500**  
Увреждане на зъбите, изискващо лечение



**1 на 10 000**  
Анафилаксия (тежка алергична реакция към лекарството)



**МНОГО РЕДКИ – МЕЖДУ 1 НА 10 000 ДО 1 НА 100 000 ИЛИ ПОВЕЧЕ**  
Равносилно на един човек в голям град



Рисковете, които всички ние поемаме в ежедневиия живот, като пътуване по пътищата, всъщност са много по-големи от долупосочените.



**1 на 20 000**  
Запазване на съзнание по време на упойката



**1 на 100 000**  
Загуба на зрение



**1 на 100 000**  
Смърт като пряко следствие от упойката

\*The first Sprint National Anaesthesia Project (SNAP-1) Study. *Br J Anaesth* 2016 (<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).