

એનેસ્થેશિયામાં સામાન્ય ઘટનાઓ અને જોખમો

આ સારાંશ કાર્ડ એ સામાન્ય ઘટનાઓ અને જોખમો બતાવે છે જે સામાન્ય વજનના તંદુરસ્ત પુખ્ત દર્દીઓ જ્યારે નિયમિત શસ્ત્રક્રિયા (નિષ્ણાત શસ્ત્રક્રિયામાં વિવિધ જોખમો હોઈ શકે છે) માટે સામાન્ય એનેસ્થેટિકનો સામનો કરે છે.

આધુનિક એનેસ્થેટિક્સ ખૂબ જ સલામત છે. એનેસ્થેટિક દવાઓ અથવા ઉપયોગમાં લેવાતા ઉપકરણોની કેટલીક સામાન્ય આડઅસરો છે, જે સામાન્ય રીતે ગંભીર નથી હોતી અથવા લાંબા સમય સુધી ચાલતી નથી. જોખમો વ્યક્તિથી-વ્યક્તિ વચ્ચે ભિન્ન હોઈ શકે છે અને તે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ અને એનેસ્થેટિક તકનીક પર આધારિત છે. તમારે તેમની સાથે તમારા માટે જે પણ મહત્વનું લાગે છે તેની ચર્ચા કરવી જોઈએ.

તમારા એનેસ્થેટીસ્ટ અમુક ઓછા સામાન્ય જોખમોની નિયમિત ચર્ચા નહીં કરે જેનું તમને વધારે જોખમ ન હોય. આ પત્રિકામાં તેમને બતાવેલ નથી.



ખૂબ સામાન્ય - ૧૦ માંથી ૧
- તમારા કુટુંબના એક વ્યક્તિ જેટલું સમાન



માંદગી



ધુજારી



તરસ*



સુકું ગળું



ઉઝરડો



હંગામી ધોરણે યાદશક્તિ ગુમાવવી
(મુખ્યત્વે ૬૦ થી વધુ ઊંમરે)



સામાન્ય - ૧૦ માંથી ૧ અને ૧૦૦ માંથી ૧ ની વચ્ચે
શેરીમાંના એક વ્યક્તિ બરાબર



ઈન્જેક્શન મારવાની જગ્યાએ દુખાવો*



હોઠ અથવા જીભની મામૂલી ઇજા



અસામાન્ય - ૧૦૦ માંથી ૧ અને ૧,૦૦૦ માંથી ૧ ની વચ્ચે
એક ગામમાં એક વ્યક્તિ બરાબર



નાની જ્ઞાનતંતુની ઇજા



દુર્લભ - ૧,૦૦૦ માંથી ૧ અને ૧૦,૦૦૦ માંથી ૧ ની વચ્ચે
નાના શહેરમાં એક વ્યક્તિ બરાબર



૧,૦૦૦ માંથી ૧
આસપાસના જ્ઞાનતંતુને કાયમી નુકસાન



૨,૮૦૦ માંથી ૧
કોર્નિયલ ઘર્ષણ
(આંખ પર સ્કેચ)



૪,૫૦૦ માંથી ૧
સારવાર જરૂરી બને તેવું દાંતને નુકસાન



૧૦,૦૦૦ માંથી ૧
એનાફિલેક્સિસ
(દવામાં તીવ્ર એલર્જીક પ્રતિક્રિયા)



ખૂબ જ દુર્લભ - ૧૦,૦૦૦ માંથી ૧ થી ૧૦૦,૦૦૦ માંથી ૧ અથવા વધુ
મોટા શહેરમાં એક વ્યક્તિ બરાબર



સામાન્ય જીવનમાં આપણે જે જોખમો લઈએ છીએ, જેમ કે રસ્તાની મુસાફરી, તે ખરેખર નીચે આપેલા જોખમો કરતા વધારે હોય છે.



૨૦,૦૦૦ માંથી ૧
એનેસ્થેટિક દરમિયાન સભાનતા



૧૦૦,૦૦૦ માંથી ૧
દ્રષ્ટિ ગુમાવવી



૧૦૦,૦૦૦ માંથી ૧
એનેસ્થેસિયાના સીધા પરિણામ રૂપે મૃત્યુ

પ્રથમ સ્પિન્ટ નેશનલ એનેસ્થેસિયા પ્રોજેક્ટ (SNAP-1) અભ્યાસ. બીઆર જે એનેસ્થ 2016

<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>