

Dažniau pasitaikantys reiškiniai ir rizika, susiję su anestezija

Šiame bendro pobūdžio informacijos lape apibūdinti dažniau pasitaikantys reiškiniai ir rizika, kuriuos patiria sveiki, normalaus svorio suaugusieji pacientai, kai jiems taikoma bendroji anestezija eilinės operacijos metu (specifinės operacijos gali kelti kitokio pobūdžio riziką).

Modernūs anestetikai yra labai saugūs. Esama dažnesnių šalutinio poveikio reiškinų, kuriuos sukelia anestetikai arba naudojama įranga, tačiau tas poveikis paprastai nėra didelis ir ilgai netrunka. Rizikos laipsnis įvairiems žmonėms nėra vienodas ir priklauso nuo atliekamos procedūros ir anestezijos metodo. Jūsų anesteziologas su Jumis aptars rizikos veiksnius, kurie, jo manymu, gali būti **reikšmingi** Jums. Taip pat, turėtumėte aptarti viską, kas jūsų nuomone yra svarbu.

Esama ir kitų, ne tokių dažnų rizikos veiksnių, kurių anesteziologas paprastai neaptaria, nebent, jo manymu, Jūs patenkate į didesnės rizikos grupę. Šiame informaciniame lape jie nenurodyti.



LABAI DAŽNAS - DAUGIAU NEI 1 IŠ 10.
Atitinkamai vienam asmeniui jūsų šeimoje



Ligos



Drebulys



Troškulys*



Gerklės skausmas



Kraujosrūvos



Laikinas atminties praradimas
(dažniausiai pasireiškiantis asmenims, kuriems virš 60 metų)



DAŽNAS - TARP 1 IŠ 10 IR 1 IŠ 100.
Atitinkamai vienam asmeniui gatvėje



Skausmas injekcijos vietoje*



Nedideli lūpos ar liežuvio sužeidimai



NEDAŽNI - PASIREIŠKIAANTYS 1 IŠ 100 IR 1 IŠ 1000 ASMENŲ.
Atitinkamai vienam asmeniui visame kaime



Nedidelis nervinės sistemos sužeidimas



RETAS - PASIREIŠKIAANTIS 1 IŠ 1000 IR 1 IŠ 10 000 ASMENŲ.
Atitinkamai vienam asmeniui nedideliame miestelyje



1 iš 1000
žmonių patirs nuolatinį periferinių nervų pažeidimą



1 iš 2 800
patirs ragenos abraziją (įbrėžimas ant akies)



1 iš 4 500
žmonių patirs žalą dantims, kuriuos vėliau reikės taisyti



1 iš 10 000
žmonių patirs anafilaksiją - smarkią alerginę reakciją į vaistus



LABAI RETAS - NUO 1 IŠ 10 000 ASMENŲ IKI 1 IŠ 100 000 ASMENŲ AR DAUGIAU.
Atitinkamai vienam asmeniui dideliame mieste



Dalykai, kuriais rizikuojame savo kasdieniniame gyvenime, **pavyzdžiui kelionės autotransportu**, iš tiesų yra daug pavojingesni nei minėtieji apačioje.



1 iš 20 000
sąmoningumas anestezijos metu



1 iš 100 000
regėjimo praradimas



1 iš 100 000
anestezijos sukelta mirtis

*Pirmasis „Sprint“ nacionalinės anestezijos projekto (SNAP-1) tyrimas. Br J Anaesth 2016 m. (<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).