

Evenimente și riscuri frecvente în procedeele medical de anestezie

Această broșură succintă prezintă evenimentele și riscurile cu care se confruntă pacienții adulți sănătoși, de greutate normală, atunci când li se administrează un anestezic general, pentru o intervenție chirurgicală de rutină (intervențiile chirurgicale specializate pot avea riscuri diferite).

Anestezicele moderne sunt foarte sigure. Există unele reacții adverse frecvente asociate medicamentelor sau echipamentelor anestezice utilizate, care de obicei nu sunt grave sau de lungă durată. Riscul variază de la persoană la persoană și depinde de procedura și tehnica de anestezie utilizată. Medicul anestezist va discuta cu dumneavoastră riscurile pe care le consideră a fi mai semnificative în cazul dumneavoastră. De asemenea, ar trebui să discutați cu el orice considerații că este important pentru dumneavoastră.

Există și alte riscuri mai puțin frecvente pe care medicul anestezist nu le detaliază în mod obișnuit, cu excepția cazului în care crede că există un risc mai mare pentru dumneavoastră. Acestea nu au fost prezentate în broșura de față.



FOARTE FRECVENTE – MAI MULT DE 1 DIN 10 CAZURI

Echivalent cu o persoană din familia dvs.



Stare de rău



Frisoane



Sete*



Durere în gât



Apariția de vânătăi



Pierderi temporare de memorie
(în special în cazul persoanelor cu vârste peste 60 de ani)



FRECVENTE – ÎNTRE 1 DIN 10 ȘI 1 DIN 100 DE CAZURI

Echivalent cu o persoană de pe o stradă



Durere la locul de injectare*



Leziune minoră la nivelul buzelor sau limbii



MAI PUȚIN FRECVENTE – ÎNTRE 1 DIN 100 ȘI 1 DIN 1.000 DE CAZURI

Echivalent cu o persoană dintr-un sat



Leziuni minore ale nervilor



RARE – ÎNTRE 1 DIN 1.000 ȘI 1 DIN 10.000 DE CAZURI

Echivalent cu o persoană dintr-un mic oraș



1 din 1.000 de cazuri
Afectarea permanentă a nervilor periferici



1 din 2.800 de cazuri
Abraziune corneană (zgârietură la nivelul ochiului)



1 din 4.500 de cazuri
Deteriorarea dinților care necesită tratament



1 din 10.000 de cazuri
Anafilaxie (reacție alergică severă la un medicament)



FOARTE RARE – 1 DIN 10.000 PÂNĂ LA 1 DIN 100.000 DE CAZURI SAU MAI RAR

Echivalent cu o persoană dintr-un oraș mare



Riscurile pe care ni le asumăm cu toții în viața normală, cum ar fi la deplasarea cu mașina, sunt de fapt cu mult mai mari decât riscurile enumerate mai jos.



1 din 20.000 din cazuri

Stare de conștiență în timpul anesteziei



1 din 100.000 de cazuri

Pierderea vederii



1 din 100.000 de cazuri

Deces ca rezultat direct al anesteziei

*Primul studiu Sprint National Anaesthesia Project (SNAP-1). Br J Anaesth 2016

(<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).