

Часто встречающиеся побочные эффекты и риски анестезии

В данной итоговой карточке представлены распространенные случаи и риски, которые могут возникнуть у здоровых взрослых пациентов с нормальным весом при применении общей анестезии во время обычной операции (при особых операциях могут возникнуть другие риски).

Современная анестезия довольно безопасна. Существуют некоторые распространенные побочные эффекты от применения анестезирующих препаратов или оборудования, которые, как правило, не являются серьезными или продолжительными. Риски могут быть разными у различных людей и зависят от применяемой процедуры и вида анестезии. Ваш анестезиолог обсудит с вами возможные риски, которые он считает для вас наиболее значительными. Вам также следует обсудить с ним всё, что вы сочтете необходимым.

Существуют другие, менее распространенные риски, которые ваш анестезиолог обычно не будет обсуждать в плановом порядке. Исключение этому — случаи, когда есть основания полагать, что вы подвержены более высокому риску. Эти риски не рассматриваются в данной карточке.



ВСЬМА РАСПРОСТРАНЕНО – более чем 1 из 10
Эквивалентно одному члену семьи



Тошнота



Дрожь



Жажда*



Боль в горле



Образование
синяков



Временная потеря
памяти (в основном у
лиц старше 60 лет)



РАСПРОСТРАНЕНО: МЕЖДУ 1 из 10 и 1 из 100
Эквивалентно одному человеку на улице



Боль в месте инъекции*



Незначительные повреждения
губы или языка



МАЛО РАСПРОСТРАНЕНО: МЕЖДУ 1 ИЗ 100 И 1 ИЗ 1000
Эквивалентно одному человеку на деревню



Незначительное повреждение
лицевого нерва



РЕДКО РАСПРОСТРАНЕНО: МЕЖДУ 1 ИЗ 1000 И 1 ИЗ 10000
Эквивалентно одному человеку в небольшом городе



1 из 1000
Необратимое
повреждение
периферического нерва



1 из 2800
Эрозия роговицы
(царапина на
глазу)



1 из 4500
Повреждение
зубов, требующее
лечения



1 из 10000
Анафилаксия
(тяжелая
аллергическая
реакция на
препарат)



ОЧЕНЬ РЕДКО: 1 ИЗ 10 000 ДО 1 ИЗ 100 000 И БОЛЕЕ
Эквивалентно одному человеку в большом городе



Риски, принимаемые в повседневной жизни, такие как передвижение по дороге, действительно встречаются чаще, чем указанные ниже риски.



1 из 20 000
Нахождение в сознании во
время анестезии



1 из 100 000
Потеря зрения



1 из 100 000
Смерть как
непосредственный
результат анестезии

*Исследование в рамках Первого национального проекта по анестезии (SNAP-1). Br J Anaesth 2016
(<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).