

Eventos y riesgos comunes en la anestesia

Esta ficha resumen muestra los eventos y riesgos comunes que enfrentan los pacientes adultos sanos y de peso normal cuando se les administra anestesia general para una cirugía de rutina (las cirugías especializadas pueden conllevar diferentes riesgos).

Los anestésicos modernos son muy seguros. Existen algunos efectos secundarios comunes de los medicamentos o equipos anestésicos utilizados que, por lo general, no son graves ni duraderos. Los riesgos varían de una persona a otra dependiendo de los procedimientos y las técnicas anestésicas empleadas. Su anestesista hablará con usted sobre los riesgos que considera más significativos para usted. Usted también debería hacerle cualquier consulta que considere importante.

Hay otros riesgos menos comunes de los que su anestesista normalmente no hablará de forma rutinaria a menos que considere que usted corre un mayor riesgo. Estos no aparecen en este folleto.



MUY COMÚN – MÁS DE 1 DE CADA 10
Equivalente a una persona en su familia



Náuseas



Escalofríos



Sed*



Dolor de garganta



Hematomas



Pérdida de memoria temporal (principalmente en personas mayores de 60 años)



COMÚN – ENTRE 1 DE CADA 10 Y 1 DE CADA 100
Equivalente a una persona en una calle



Dolor en el lugar de la inyección*



Pequeña lesión en el labio o la lengua



POCO COMÚN – ENTRE 1 DE CADA 100 Y 1 DE CADA 1000
Equivalente a una persona en un pueblo



Daño nervioso menor



RARAMENTE – ENTRE 1 DE CADA 1000 Y 1 DE CADA 10 000
Equivalente a una persona en una ciudad pequeña



1 de cada 1000
Daño permanente en nervios periféricos



1 de cada 2800
Abrasión corneal (rasguños en el ojo)



1 de cada 4500
Daño a la dentadura que requiere tratamiento



1 de cada 10 000
Anafilaxia (reacción alérgica grave a un medicamento)



MUY RARAMENTE – DE 1 DE CADA 10 000 A 1 DE CADA 100 000 O MÁS
Equivalente a una persona en una ciudad grande



Los riesgos que tomamos en nuestra vida normal, como los desplazamientos por carretera, son más altos que los que se citan a continuación.



1 de cada 20 000
Consciencia durante la anestesia



1 de cada 100 000
Pérdida de la visión



1 de cada 100 000
Muerte como resultado directo de la anestesia

*El primer estudio de Sprint National Anaesthesia Project (SNAP-1). Br J Anaesth 2016 (<https://academic.oup.com/bja/article/117/6/758/2671124>).